19 de Abril de 2006 | Universidad de Granada | Diario Médico

DIARIO MEDICO.COM

BUSCAR BÚSQUEDA AVANZ

| Congresos | Archivo | Empleo | Quién es quién | Tienda | DM Móvil | Documentos | Formación | Medline | Newsletter

Diariomedico.com > Especialidades > Reumatología Ir a > ÁREA PROFESIONAL · ÁREA CIENTÍ

SECCIONES
SANIDAD
PROFESIÓN
NORMATIVA
GESTIÓN
ENTORNO
MEDICINA
INTERNET
DM HOY
ASESOR
TECNOLOGÍA
ESPECIALES
ENTREVISTAS
INVESTIGAR EN EUROPA
BLOGS
ENCUESTAS
CONGRESOS ON-LINE
MULTIMEDIA
RSS [NUEVO]

REUMATOLOGÍA

[Envíe esta noticia] [Imprimir] [Feedback]

19/04/2006

Sara Sánchez Conde. Córdoba

La quetiapina mejora la clínica de la fibromialgia

La quetiapina, un fármaco utilizado en la esquizofrenia, mejora algunos síntomas de la fibromialgia, aunque no mitiga el dolor, según una investigación de la Universidad de Granada.

El grupo de estudio de Cefaleas y Fármacos Activos sobre el Sistema Nervioso Central de la Universidad de Granada (UGR) ha iniciado una investigación para buscar medicamentos que mitiguen los efectos de la fibromialgia, una dolencia que afecta al 3 por ciento de los españoles. La mayoría de los enfermos son mujeres de más de 50 años que sufren dolor muscular injustificado, fatiga, insomnio y depresión, entre otros síntomas.

Elena Pita Calandre, profesora de la Facultad de Medicina de Granada y responsable de la investigación, ya ha detectado fármacos que mejoran los períodos de descanso de los pacientes y, por tanto, reducen efectos como la fatiga.

En concreto, Pita ha demostrado los efectos beneficiosos de la quetiapina, un medicamento indicado para la esquizofrenia "que mejora la eficiencia del sueño". Según ha explicado, este fármaco no mitiga el dolor, "pero disminuye el cansancio, la rigidez muscular y la ansiedad, con lo que sienta las bases para aplicar otros tratamientos destinados a erradicar la enfermedad".

Pita, que también ha experimentado con diversos ansiolíticos y antiepilépticos, ha decidido continuar sus investigaciones con la pregabalina, un fármaco que disminuye el dolor: "Unida a la quetiapina, esta sustancia podría producir resultados satisfactorios en los pacientes estudiados".

Ensayo doble ciego

Tras este primer acercamiento, Pita va a ampliar sus estudios con un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Algunas personas de la muestra recibirán quetiapina y otras un placebo sin que el facultativo o el enfermo sepan si están administrando el fármaco o el componente de prueba. De esta forma se detectarán los resultados reales del medicamento.

Además de la opción farmacológica, Pita ha recomendado seguir un tratamiento múltiple que combina ejercicio físico suave en una piscina de agua caliente y terapia psicológica.

ESPECIALIDADES Especialidades -

CORREO FARMACÉUTICO.COM ONDASALUD.COM Iber-X INSIDE

© Recoletos Grupo de Comunicación. Aviso Legal. Quiénes somos. Publicidad.
La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por requiere una formación especializada para su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de Madrid,

19 de Abril de 2006 | Universidad de Granada | Diario Médico

autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997.