

USP Hospitales Te Ofrece Canal Salud

Esperar dos minutos para cortar el cordón umbilical previene la anemia infantil, según un estudio



MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esperar dos minutos para sujetar el cordón umbilical después del parto podría prevenir la anemia en la infancia, según un estudio que Catalina de Paco ha realizado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada.

A esta conclusión llegó la especialista luego del análisis de 151 cordones umbilicales de neonatos provenientes de embarazos y partos normales a término. De todos ellos, en 79 casos el cordón se cortó antes de 20 segundos y 72 dos minutos después de la expulsión fetal.

La investigadora ha observado que no existe "ningún factor científico que haga aconsejable la ligadura precoz del cordón umbilical". Por lo tanto, no encuentra ninguna justificación para que se haya abandonado la antigua práctica de "ligadura tardía en recién nacidos normales a término".

Por otro lado, si el cordón se corta dos minutos después del parto aumenta la presión parcial de oxígeno en la arteria umbilical y se presenta "una menor necesidad de oxigenoterapia", sin que haya diferencias en el sangrado materno posparto, "uno de los motivos por los cuales comenzó la realización de la ligadura precoz del cordón umbilical".

En el análisis de la concentración de melatonina, se encontró con "diferencias estadísticamente significativas entre la concentración de melatonina (aMT) en la vena y en la arteria umbilical (mayor concentración en la arteria)", lo que sugiere que el feto recibe melatonina de la madre a través de la vena umbilical y "también la produce ante situaciones de estrés, como puede ser el parto".

Imprimir Enviar Marcadores:

Más Noticias Destacados Más Leídas

- La mitad de los pacientes que acuden a las unidades de hipertensión en hospitales son controlados, según un estudio
- Esperar dos minutos para cortar el cordón umbilical previene la anemia infantil, según un estudio
- Sanidad se compromete con los MIR a que su jornada sólo supere las 24 horas en caso de "emergencias imprevisibles"
- Empresas.- Artovastatina Pfizer reduce el riesgo cardiovascular en casos de ictus o accidente coronario, según estudio
- Asturias.- Avilés acoge una jornada sobre servicios para la reinserción de reclusos drogodependientes
- Cantabria.- Diez médicos secundan hoy el paro, lo que representa el 0,79 por ciento
- La migraña es una enfermedad "incapacitante" que afecta más a las mujeres y a menores de 65 años, según un estudio
- Gripe.- Indonesia enviará muestras de gripe aviar a la Organización Mundial de la Salud
- Especialistas aseguran que antes de que cumplan 60 años, la mitad de las personas van a tener...

Espacio USP Hospitales



Red de Centros USP
Noticias de USP Hospitales

www.usphospitales.com



Stem Cell
Banco de Células Madre Delegaciones en toda España

[Anuncios Goooooogole](#)

Crio-Cord: más de 2400 ud
Sangre de cordón umbilical Primer banco privado de España

[Anunciarse en este sitio](#)



Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid
17/04/2007



Especiales

Cultura
C.Valenciana
Pesca Galicia
Galicia Rural

