



Portada	Confidencial	Por lo breve	Enormes minucias	Cartas al director	Radio y Televisión	Exclusivas
						Otras secciones

Próxima edición: 29 de marzo de 2007 (15:15 horas)Fecha Publicación: Miércoles, 28 de marzo de 2007Número: 2654

Servicios

Suscripción gratuita

Libros

Películas

RSS Titulares en RSS

Por lo Breve

■ La retribución del consejo de Acciona se sitúa en los 950.000 euros anuales

■ Solbes presume de modernización del sector financiero

■ Antonio Catalán, los problemas de una amistad

■ El FMI de Rato quiere privatizar las cajas de ahorro

■ El State Street Bank invierte 190 millones de euros en Telefónica

■ “Si ETA mata, gana el PP; si ETA no mata gana el PSOE: los terroristas mandan en España”

■ Diputado de Londres en la carrera de San Jerónimo

■ Nuevo cabreo entre la Generalitat valenciana y el Gobierno central

■ Solbes le da oxígeno a Chaves con la emisión de 460 millones de euros de deuda

■ Esplugas de Llobregat, Castellón y Elda (Alicante) ya han cancelado las actuaciones blasfemas de Leo Bassi

■ La AVT presenta su querrella contra Conde Pumpido y el fiscal Burgos

Última Hora

Esperar dos minutos para cortar el cordón umbilical previene la anemia infantil, según un estudio

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Esperar dos minutos para sujetar el cordón umbilical después del parto podría prevenir la anemia en la infancia, según un estudio que Catalina de Paco ha realizado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada.

A esta conclusión llegó la especialista luego del análisis de 151 cordones umbilicales de neonatos provenientes de embarazos y partos normales a término. De todos ellos, en 79 casos el cordón se cortó antes de 20 segundos y 72 dos minutos después de la expulsión fetal.

La investigadora ha observado que no existe "ningún factor científico que haga aconsejable la ligadura precoz del cordón umbilical". Por lo tanto, no encuentra ninguna justificación para que se haya abandonado la antigua práctica de "ligadura tardía en recién nacidos normales a término".

Por otro lado, si el cordón se corta dos minutos después del parto aumenta la presión parcial de oxígeno en la arteria umbilical y se presenta "una menor necesidad de oxigenoterapia", sin que haya diferencias en el sangrado materno posparto, "uno de los motivos por los cuales comenzó la realización de la ligadura precoz del cordón umbilical".

En el análisis de la concentración de melatonina, se encontró con "diferencias estadísticamente significativas entre la concentración de melatonina (aMT) en la vena y en la arteria umbilical (mayor concentración en la arteria)", lo que sugiere que el feto recibe melatonina de la madre a través de la vena umbilical y "también la produce ante situaciones de estrés, como puede ser el parto".

Edita: López Samanes, S.L. | Director: [Eulogio López](#) | Redactor Jefe: [Rodrigo Martín](#) | Director de Opinión: [Javier Paredes](#) | Gerente: [Juana Samanes](#) | Asesor Editorial: [Francisco Ansón](#)

HISPANIDAD Periódico electrónico editado en España. C/ Recoletos 11, 28001-Madrid. Telf.915781135. Fundado el 20 de marzo de 1996 (c) Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de Hispanidad.com sin autorización previa de la sociedad editora.

http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070328150245

29/03/2007