

Más de **22.000 hoteles**
en **3.300 ciudades**



Jueves, 29 de marzo de 2007. Actualizado a las **10:01** (CET)

[Página de inicio](#) | [Favoritos](#) | [Tonos para móviles](#) | [Cursos](#) | [Pisos](#)

[Google](#) [Siglo XXI](#) | [IMÁGENES](#) | [ÚLTIMA HORA](#) | [CHAT Y CHARLAS](#) | [ENCUESTAS Y COMETARIOS](#) | [EL TIEMPO](#) | [SERVICIOS](#)

Portada

Opinión

[Firmas](#)
[Viñetas](#)

Entrevistas

Especiales

Magazine



España

[Internacional](#)
[Europa](#)
[América](#)
[África, Asia, Oc.](#)

Deportes

[Fútbol](#)
[Baloncesto](#)
[Entrevistas](#)
[Motor](#)
[Balonmano](#)
[Tenis](#)
[Ciclismo](#)
[Golf](#)
[Atletismo](#)
[Más noticias](#)

Economía

[Vivienda](#)
[Automóviles](#)

Cultura y ocio


[Cine](#)
[Televisión](#)
[Música](#)
[Libros](#)

Sociedad

[Sucesos y Trib.](#)
[Ciencia](#)
[Religión](#)
[Prensa y medios](#)
[Educación](#)
[Gente](#)

La Lidia

[Donde yo te llevaría...](#)



Confidencial 7D
Infórmate en la red

4 SEMANAS

Enfermedades, Medicina

Publicado el 28 de marzo de 2007 a las 15:02 horas. | [Imprimir](#)

Esperar dos minutos para cortar el cordón umbilical previene la anemia infantil, según un estudio

Redacción / EP

Esperar dos minutos para sujetar el cordón umbilical después del parto podría prevenir la anemia en la infancia, según un estudio que Catalina de Paco ha realizado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada.

A esta conclusión llegó la especialista luego del análisis de 151 cordones umbilicales de neonatos provenientes de embarazos y partos normales a término. De todos ellos, en 79 casos el cordón se cortó antes de 20 segundos y 72 dos minutos después de la expulsión fetal.

La investigadora ha observado que no existe "ningún factor científico que haga aconsejable la ligadura precoz del cordón umbilical". Por lo tanto, no encuentra ninguna justificación para que se haya abandonado la antigua práctica de "ligadura tardía en recién nacidos normales a término".

Por otro lado, si el cordón se corta dos minutos después del parto aumenta la presión parcial de oxígeno en la arteria umbilical y se presenta "una menor necesidad de oxigenoterapia", sin que haya diferencias en el sangrado materno posparto, "uno de los motivos por los cuales comenzó la realización de la ligadura precoz del cordón umbilical".

En el análisis de la concentración de melatonina, se encontró con "diferencias estadísticamente significativas entre la concentración de melatonina (aMT) en la vena y en la arteria umbilical (mayor concentración en la arteria)", lo que sugiere que el feto recibe melatonina de la madre a través de la vena umbilical y "también la produce ante situaciones de estrés, como puede ser el parto".

Noticias relacionadas patrocinadas por [AquiSpain Inmobiliaria](#)

La mitad de los pacientes que acuden a las unidades de hipertensión en hospitales son controlados, según un estudio

Esperar dos minutos para cortar el cordón umbilical previene la anemia infantil, según un estudio

Diez médicos secundan hoy el paro, lo que representa el 0,79 por ciento

La migraña es una enfermedad 'incapacitante' que afecta más a las mujeres y a menores de 65 años, según un estudio

Especialistas aseguran que antes de que cumplan 60 años, la mitad de las personas van a tener cáncer de piel maligno

Anuncios Goooooogle

Stem Cell

Banco de Células Madre
Delegaciones en toda
España
www.bancostemcell.com

Parto

Toda la información para las mamás sobre el embarazo y los bebés
www.mapfrecajasalud.com

Crio-Cord: más de 2400 ud

Sangre de cordón umbilical Primer banco privado de España
www.crio-cord.es

Bebé Vida - Bioteca

Células madre de Cordón Umbilical Banco de Cordón propio en Lisboa
www.bebevida.es

La Web del Niño

Prematuro
Información a padres y cuidadores, Foro, Testimonios, Noticias, Links
www.prematuros.info

Anunciarse en este sitio