Viernes, 22.05.2009,

IBEX 35: 9.333,80 (+1,18) Valores: ABENGOA 17,70 (+2,79%) | ABERTIS 12,75 (-0,55%) | ACCIONA 92,35 (+2,10%) | ACERINOX 12,48 (+1,88%) | ACS 37,50 (+0,78%) | ARCELORMITTAL 21,38

Comunidad

- INS en favoritos
- INS como inicio
- Los Foros
- Mensajes
- Inicio sesión
- Regístrate
- Encuestas
- Mapa Web
- Suscribirse al RSS

Menú Noticias

- Inicio
- Nacional
- Ciencia
- Cine
- Cultura
- Motor
- Tecnología
- Música
- Gente
- Salud
- Sorteos

Economía

- Portada Economía
- Destacados INS
- Empresas
- Finanzas
- Mercados
- Ibex-35
- Cotizaciones
- Macroeconomía
- Vivienda
- Energía
- Empleo

Deportes

- Portada Deportes
- Fútbol
- Fórmula 1
- Motociclismo
- Baloncesto
- Tenis
- Golf
- Atletismo
- Ciclismo

Internacional

- Portada Internacional
- Economía
- Política
- Sociedad

Publicidad

Noticia Ampliada

ESTUDIO EN BOQUERONES DEL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO

El riesgo de anisakis varía según la procedencia del pescado

GRANADA, 21 May. (InverNews.- Redacción/EP).

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada han confirmado una mayor presencia del parásito Anisakis spp en los boquerones de la costa suroeste peninsular del Atlántico y la noroeste del Mediterráneo, e insisten en congelar o cocinar el pescado antes de consumirlo.

Aunque la Unión Europea y las normas españolas obligan a los restaurantes a congelar el pescado que se consume crudo, "la preparación casera de los boquerones en vinagre mantiene el riesgo de anisakiasis, si previamente no se adquiere la costumbre de congelar los boquerones al menos 24 horas a -20 ºC", afirman los científicos de la UGR, que ha detectado larvas de Anisakis spp y de otro parásito similar, Hysterothylacium aduncum, en boquerones del oeste del Mar Mediterráneo y del este del Océano Atlántico.

"El riesgo de contraer una anisakiasis por ingestión de boquerones (Engraulis encrasicolus), puede estar influenciada por la zona geográfica de captura, pues hay una gran variación en la parasitación (prevalencia e intensidad media) de los boquerones de diferentes áreas", explica a la plataforma SINC Adela Valero, autora principal e investigadora del Departamento de Parasitología de la UGR.

En el estudio, que se ha publicado recientemente en International Journal of Food Microbiology, se han analizado 792 boquerones obtenidos de octubre de 1998 a septiembre 1999 en el mercado de pescado de Granada. La mitad procedía del este del Océano Atlántico (Golfo de Cádiz y Estrecho de Gibraltar) y los otros 396 del oeste del Mar Mediterráneo (Mar de Alborán, Mar Catalán, Golfo de León y Mar de Liguria).

Según los investigadores, el parásito Hysterothylacium aduncum fue más frecuente en los boquerones del noroeste del Mediterráneo, en concreto el Golfo de León y el Mar de Liguria. En los boquerones capturados en la zona atlántica del Estrecho de Gibraltar (Golfo de Cádiz y el propio Estrecho), anisakis es más frecuente que los que proceden de la zona mediterránea (Mar de Alborán), "según parece por la presencia de cetáceos", apunta Valero.

"Esta relación es especialmente evidente en los boquerones procedentes del Mar de Liguria, donde la presencia de Anisakis y de cetáceos es mayor que en el resto de las zonas estudiadas", subraya Francisco Javier Adroher, otro de los autores e investigador de la UGR. Esto supone un riesgo mayor para los consumidores, si no congelan el pescado.

Otro factor que aumenta la probabilidad de infección por el parásito es la migración de la larva al músculo del pez. Según los científicos, "la mayor presencia del parásito en el músculo aumenta el riesgo de contraer anisakiasis con el consumo de boquerones en vinagre". Los científicos granadinos han demostrado también que la presencia del parásito en los peces aumenta cuanto más largo sea el pez. "Como los boquerones en vinagre se preparan con los más grandes, también aumenta el riesgo", añade Adroher.

Valero y su equipo señalan que se necesitan más estudios para identificar las áreas marinas con mayor presencia de parásitos, y que pueden afectar la salud humana. De esta forma se determinará si la abundancia del parásito en ciertas zonas varía con el tiempo, "lo que permitiría diseñar y aplicar medidas que limiten la exposición de los humanos a los parásitos".

Comparte esta noticia:

Ahora en portada de deportes...



GIRO DE ITALIA

Denis Menchov da un golpe de mano en la 'crono'

El ciclista ruso Denis Menchov (Rabobank) dio un

Alonso, lejos de los mejores puestos en los entrenamientos de Mónaco

Lo + Visto en INS

Brad Pitt y Angelina Jolie de la mano en Cannes

'Águila Roja' despide su primera temporada

Bella se debate entre Edward y Jacob

Ofrecido por:

Cotizaciones

IBEX-35

ÍNDICES

FTSE	4369,71	0,56%
CAC	3239,96	0,70%
DAX	4940,32	0,81%
DOW JONES	8292,13	-1,54%
NASDAQ	1367,39	-1,89%
NIKKEI	9225,81	-0,41%

+ SUBEN IBEX

SACYR VALLEH	11,42	4,48%
TELECINCO	7,00	3,40%
ABENGOA	17,69	2,73%

+ BAJAN IBEX

ABERTIS	12,77	-0,39%
INDITEX	31,13	-0,19%
TEC.REUNIDAS	30,00	0,17%