

Publicidad

¡Enhorabuena!

¡Eres el visitante 999.999! Has sido seleccionado ahora como el posible ganador de un
AUDI A3 Cabrio – 20.000 € – Equipo Multimedia
 En el caso de ser seleccionado, [haz click aquí](#)

Consulta todos los
**premios y
 loterías**
 en
adn.es



/ Sociedad

Jueves, 24 de septiembre de 2009. Actualizado a las 11:22h | Bilbao: 25º/15º

[Portada](#)
[Local](#)
[Actualidad](#)
[La Vida](#)
[Deportes](#)
[Cultura & Ocio](#)
[Opinión](#)
[Fotos](#)
[Vídeos](#)

[Sociedad](#)
[Tecnología](#)

[Motor](#)
[Servicios](#)

adn » sociedad

Logran diagnosticar de forma precoz varias patologías oculares, como la degeneración macular asociada a la edad

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han logrado diagnosticar de forma precoz algunas patologías oculares muy frecuentes en la actualidad, como la degeneración macular asociada a la edad y la queratitis, mediante la aplicación de una técnica óptica que, aunque ya existía, no se había empleado nunca para este fin.

Europa Press , SEVILLA | hace 2 minutos | [Comenta](#) | Votar + 0 - 0 | [Imprimir](#)

En concreto, los científicos de la UGR han estudiado la calidad de imagen en sujetos afectados por alguna de estas dos patologías, encontrando una mayor cantidad de aberraciones oculares y un mayor nivel de scattering (término asociado a la dispersión que sufre la luz al atravesar los distintos medios oculares) en los ojos afectados con respecto a los resultados obtenidos en los ojos sanos, algo que influye de forma significativa en el rendimiento visual.

Este trabajo ha sido realizado por la investigadora Carolina Ortiz Herrera, del departamento de Óptica de la Universidad de Granada, y dirigido por los profesores José Ramón Jiménez Cuesta y Francisco Pérez Ocón, según informó hoy en una nota la citada institución académica.

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la principal causa de pérdida de visión central en países desarrollados, y afecta principalmente a personas mayores de 50 años. Por su parte, la queratitis produce inflamación de la córnea con riesgo de ceguera debido a las graves alteraciones que puede llegar a sufrir la superficie corneal.

Para llevar a cabo este trabajo, se midió la calidad de imagen con dos instrumentos ópticos y emplearon un test psicofísico para valorar el rendimiento visual. Los resultados obtenidos para los pacientes con DMAE fueron comparados con los obtenidos para un grupo control de edad similar y sin ningún tipo de patología ocular.

De esta forma, se pudo comprobar que para los sujetos afectados con esta patología existe un mayor nivel de scattering ocular que podría ser debido principalmente a la alteración que sufre la luz reflejada en la retina dañada propia de los ojos que presentan DMAE, ya que a priori la óptica no es de esperar que esté alterada, puesto que se trata de una patología retiniana.

Por otra parte, también se estudió la calidad óptica y el rendimiento visual en pacientes afectados con queratitis. Los ojos afectados con queratitis presentan una peor calidad óptica y un menor rendimiento visual que, tras la resolución de la patología, mejoran de forma significativa. Sin embargo, aun finalizado el tratamiento médico los ojos que han sufrido queratitis siguen presentando una peor calidad de imagen con respecto al ojo sano contralateral, resultado que influye de forma significativa en el rendimiento visual incluso habiéndose alcanzado los valores normales de agudeza visual.

Los resultados de esta investigación permitirán realizar una completa caracterización de la calidad visual en pacientes afectados con alguna de estas patologías oculares. Hasta ahora, el uso de nuevas técnicas que permiten valorar la calidad óptica del ojo de forma objetiva ha estado limitado a estudios sobre cirugía refractiva o de cataratas.

Sin embargo, apunta Carolina Ortiz Herrera, este trabajo "puede resultar de especial interés para establecer un diagnóstico precoz de ciertas patologías oculares como la degeneración macular asociada a la edad, principal causa de pérdida de visión central en países desarrollados".

Además, esta técnica permite llevar a cabo una monitorización de posibles etapas de ambas enfermedades. Ortiz Herrera destaca la importancia de incluir "tanto en la práctica clínica de la optometría como de la oftalmología" el uso de nuevas técnicas que, de forma objetiva, pueden indicar un deterioro en la visión incluso cuando los valores de agudeza visual son normales, puesto que "la visión no sólo es ver bien, sino presentar calidad y confort".

Los resultados de la investigación de esta tesis doctoral han dado lugar a dos publicaciones en revistas de reconocido prestigio a nivel internacional como son 'Journal of Modern Optics' y 'Cornea'. Próximamente, aparecerán en 'Current Eye Research'.

+ 0 - 0 [Comenta](#) | [Imprimir](#) | [Suscribir](#) | [Compartir:](#)

Sociedad: Noticias destacadas

El parásito de la malaria doblega al mejor fármaco contra esta enfermedad

La CUN elabora la guía de consulta "Oftalmología de bolsillo"

Una nueva vacuna contra el sida reduce en un tercio el riesgo de infección

[Ir a la portada de Sociedad](#)

Publicidad

¡No es broma! ¡Has sido seleccionado!

Por estar conectado en este momento

Has sido seleccionado como posible **ganador**
de un Audi A3 (el color lo eliges tú)

Si has llegado a tiempo, haz click aquí:
www.ganador-elegido.es

Última hora

Actualizado 11:28 h.

- 10:03** **Presentan una vacuna que reduce el contagio del sida en un 31%**
- 09:05** Zelaya se muestra dispuesto a "luchar de pie antes que vivir de rodillas ante una dictadura militar"
- 22:07** Cristiano Ronaldo mantiene el pleno de victorias del Madrid
- 20:52** Las rentas más altas tendrán que hacer un mayor "esfuerzo"
- 20:25** Bob Bell reemplazará a Briatore al frente de Renault

[Ver más noticias de Última hora](#)

Publicidad

[Degeneracion Macular](#)
 Nueva terapia con Celulas Madre
 Solicite mas informaciones ahora!
www.xcell-center.es/D_Macular

[Acupuntura para la vista](#)
 DMRE: Mácula seca y húmeda 25 años de experiencia en Acup.
dmae.acupuntura.googlepages.com

[Tienda de Lupas Técnicas](#)
 Especiales Baja Visión, en Madrid Fdez. de los Rios 36, Telf 902105803
www.magnicenter.com

[LO+ LEÍDO](#)
[LO+ VALORADO](#)
[LO+ COMENTADO](#)