

Iniciar sesion en facebook

Iniciar sesión

Regístrate

Has buscado **""universidad de granada""** en: **Google**

1558 noticias

35 fotos

1 vídeo

AYÚDANOS

SI TE GUSTA LO QUE HACEMOS

ENVÍA esta noticia a tus amigos o compártela en

Sida
Un estudio de la UGR advierte del aumento del riesgo de infección de VIH entre las mujeres en los últimos años
17:10h | EuropaPress
Un grupo de investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada (UGR) se encuentra desarrollando un estudio poblacional sobre VIH, en el que se revela que el riesgo de infeccción ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".

Share

GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
Un grupo de investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada (UGR) se encuentra desarrollando un estudio poblacional sobre VIH, en el que se revela que el riesgo de infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".
En una nota, Andalucía Innova indicó que este estudio pretende analizar los métodos de prevención utilizados por los jóvenes y los riesgos existentes en sus relaciones sexuales. Así, los expertos afirmaron que la percepción de temor ante la posibilidad de contraer el virus del sida ha disminuido entre las jóvenes, mientras que el riesgo de infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".
Por otro lado, explicaron que los roles sociales adquiridos o la discriminación por causa de género intervienen "activamente" en las conductas sexuales y, "por tanto, en la posibilidad de contagio, lo que hace que sean variables sobre las que las investigadores consideran necesario incidir".
El grupo de investigación trabaja de este modo en un programa de intervención real destinado a chicas de entre 15 y 18 años y que mantengan relaciones sexuales. Se evaluarán factores como la comunicación con la persona con la que mantienen una relación, la actitud ante la posibilidad del uso del preservativo y el miedo a la negociación de su utilización con la pareja o la sensación de vulnerabilidad o temor ante una posible infección.
El programa insiste en la necesidad de lograr la integración social de las chicas en su entorno, "sea cual sea su cultura o procedencia y considerando la multiculturalidad cómo un factor presente en las relaciones actuales y que afecta en las conductas sexuales de los jóvenes".
VARIABLES EN EL CONTAGIO
Estudios previos realizados por este mismo grupo de investigación concluyeron que existen variables sociodemográficas que incrementan el riesgo de infección por VIH, apuntando a que el porcentaje de adolescentes de centros escolares privados que no utilizó preservativo en la primera relación sexual era superior al de los centros públicos, o que el "no uso de este método anticonceptivo aumentaba en los adolescentes de entre 17 y 18 años".
Este análisis, realizado entre un total de 4.456 jóvenes de toda España, de entre 15 y 18 años, demuestra también que el porcentaje de adolescentes de centros privados que se implican en conductas de riesgo es "mayor" que el de los chicos que acuden a centros públicos. Otro de los datos relevantes es que los que asisten a colegios del primer tipo tienen más parejas sexuales que los estudiantes de los públicos.
Asimismo, el estudio establece diferencias en función del género, señalando que el número de mujeres que no utiliza preservativo con pareja fija es mayor que el de varones. En este marco, el género, la edad y el tipo de centro educativo aparecen como factores "determinantes" en las conductas sexuales de los jóvenes.

4 enlaces más sobre este asunto

Las mujeres utilizan más el testamento vital

30/11/2009 Leer artículo completo en www.elpais.com

El 65% de los que hacen un testamento vital son mujeres. El 56% tiene estudios universitarios y en uno de cada dos casos, el motivo que les llevó a rellenar este documento es la existencia de una persona cercana con una enfermedad irreversible.

Las infecciones por VIH han descendido un 17 por ciento en el mundo en los últimos ocho años

24/11/2009

Según un informe de ONUSIDA, la prevalencia aumenta hasta los 33,4 millones de personas debido a que los tratamientos antirretrovirales han reducido los fallecimientos

Las infecciones por VIH en el mundo descienden un 17% desde 2000

24/11/2009

Las infecciones por VIH se redujeron un 17 por ciento en el mundo en los últimos ocho años, según muestran los datos de un informe realizado por ONUSIDA y que ha sido publicado hoy.

Temas relacionados

[ASUNTOS SOCIALES](#) [FAMILIA](#) [SEXO](#) [EDUCACIÓN](#) [ESCUELAS](#) [SALUD](#) [ENFERMEDADES](#) [ENFERMEDADES VÍRICAS](#) [SIDA](#) [LUGARES](#) [ESPAÑA](#)