TELEPRENSA.ES
EL PERIÓDICO DIGITAL DE GRANADA

"Más desigualdad, más injusticia" Valentin Escobar. Escobar & Navarrete Abogados

Los drogadictos reconocen peor en los demás las emociones de contenido negativo, como la ira, el miedo o la tristeza

- Científicos de la UGR analizan por primera vez la relación que existe entre el consumo de drogas y el reconocimiento de cada una de las emociones básicas (felicidad, sorpresa, ira, miedo, tristeza y asco) - Este trabajo se realizó con una muestra formada por un total de 123 individuos policonsumidores de diversas drogas y 67 individuos no consumidores

16-06-2010 11:12

GRANADA.- Investigadores de la Universidad de Granada han analizado por primera vez en el mundo la relación que existe entre el consumo de drogas y el reconocimiento de cada una de las emociones básicas (felicidad, sorpresa, ira, miedo, tristeza y asco) en los drogodependientes. Así, su trabajo ha demostrado que los drogadictos reconocen peor en los demás (a través de sus expresiones faciales) las emociones de contenido negativo: ira, asco, miedo y tristeza.

Además, el consumo habitual de alcohol, cannabis y cocaína afecta comúnmente a la fluidez y la toma de decisiones del sujeto, y cuanto más cantidad de cannabis y cocaína se consume, empeora la memoria de trabajo y el razonamiento. Asimismo, la duración del consumo de cocaína se asocia a alteraciones en la inhibición.

Para la realización de este trabajo, los científicos llevaron a cabo la evaluación neuropsicológica (con pruebas de evaluación neurocognitiva y evaluación del procesamiento emocional) de un total de 123 individuos policonsumidores de diversas drogas y 67 individuos no consumidores igualados a los anteriores en las principales variables sociodemográficas (edad y escolaridad).

Una muestra de policonsumidores

La población objeto de estudio fueron individuos consumidores de drogas incluyendo cocaína, cannabis, heroína, alcohol, MDMA, y metaanfetaminas, procedentes de los centros Proyecto Hombre y Cortijo Buenos Aires de la provincia de Granada.

La autora principal de esta investigación (dirigida por los profesores Miguel Pérez García y Antonio Javier Verdejo García) ha sido María José Fernández Serrano, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada.

Las asociaciones de la prensa de Almería y Granada condenan las agresiones a periodistas a la salida de la cárcel de Enciso

La Guardia Civil rescata a un barranquista accidentado en Río Verde

MAS LEÍDOS
- IU denuncia 'los cortos' del alcalde de Jun (Granada)
- La empresa mixta Aguas de Guadix ha convocado una plaza para auxiliar administrativo
- Los populares de Purullena tachan la gestión de PSOE y PA de una "tomadura de pelo" basada en "engrosar deudas y despilfarrar"
- NNGG Vegas del Genil muestra su total "inconformismo" ante la dejadez hacia los jóvenes del alcalde socialista
- Guadix recibe en Madrid el premio 'Escoba de Plata'
- El Ayuntamiento de Santa Fe pone en marcha el III Plan para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

consumidores de drogas presenta algún tipo de deterioro neuropsicológico, independientemente del tipo de sustancia consumida.

La memoria de trabajo era el componente con mayor porcentaje de deterioro, seguida de la fluidez, la flexibilidad, la planificación, la capacidad de multitarea y la interferencia.

Fernández Serrano cree que estos resultados "deben servir como fundamento para la realización de actuaciones políticas y sociales que vayan dirigidas a fomentar programas de rehabilitación que sean adecuados y estén adaptados al perfil neuropsicológico de la población consumidora de drogas hacia la que van dirigidos".

El trabajo realizado en la UGR es la primera investigación que se hace sobre prevalencia de deterioro neuropsicológico en sujetos consumidores de drogas, usuarios de comunidades terapéuticas. Además, aunque existían estudios sobre el reconocimiento emocional en consumidores de drogas, éstos investigaban el reconocimiento como un proceso unitario. Los científicos granadinos, sin embargo, han analizado por primera vez la relación entre el consumo y el reconocimiento de cada una de las emociones básicas (felicidad, sorpresa, ira, miedo, tristeza y asco).

Referencias bibliográficas:

- Fernández-Serrano, M.J., Pérez-García, M., Verdejo-García, A. (2010) What are the specific vs. generalized effects of drugs of abuse on neuropsychological performance? Neuroscience and Biobehavioral Reviews (in press)

- Fernández-Serrano, M.J., Pérez-García, M., Schmidt, J., Verdejo-García, A. (2010) Neuropsychological consequences of alcohol and drug abuse on different components of executive functions. Journal of Psychopharmacology (in press).

- Fernández-Serrano, M.J., Lozano Rojas, O., Pérez-García, M., Verdejo-García, A. (2010) Impact of severity of drug use on discrete emotions recognition in polysubstance abusers. Drug and Alcohol Dependence, 109, 57-64.

- Fernández-Serrano, M.J., Pérez-García, M., Perales, J.C., Verdejo-García, A. (2010) Prevalence of executive dysfunction in cocaine, heroin and alcohol users enrolled in therapeutic communities. European Journal of Pharmacology, 626, 104-112.

Envianos un comentario

* Campos obligatorios.

* Nombre:

* Email:

* Comentario:

* Captcha:

Introduzca el contenido de la imagen.

Enviar comentario

Comentarios:

No hay comentarios

La Policía Nacional detiene al autor del robo con fuerza donde un policía local resulto herido leve

Expertos y representantes públicos comparten experiencias innovadoras de sostenibilidad

Se celebra en la UGR la '2ª Jornada de trabajo de responsables de Alfabetización Informacional en Bibliotecas Universitarias Españolas'

La Delegación General de Estudiantes lanza una campaña sobre derechos y deberes ante los exámenes

Mesa redonda en el Hospital de Motril sobre 'El respeto a la dignidad de la persona en el proceso de la muerte'

La Policía Nacional desmantela un piso donde se explotaba sexualmente a mujeres extranjeras

IR AL PRINCIPIO

www.rumbo.es Anuncios Google

DOCUMENTOS DE INTERÉS

ARIZA @dministraciones