

- [Identifican una de las causas de la predisposición genética al cáncer de colon](#)
- [Desarrollan una sustancia para "lavar" órganos que puede facilitar los trasplantes](#)
- Inmigrantes
 - [Salvamento Marítimo rescata una patera con 37 inmigrantes cerca de Alborán](#)
 - [Interceptan cinco pateras con más de 60 personas a bordo en las costas de Cartagena](#)
 - [La FIFA no logra convencer a Morales de salvar de la quiebra a la federación local](#)
- Opinión
 - [Dimite el coordinador territorial por Madrid de UPyD por "razones personales"](#)
 - [Rajoy en Melilla: un español en España](#)
 - [Jordi González: "La portada de 'La otra crónica' de El Mundo es mentira. Penélope Cruz no está embarazada"](#)

[Sé el primero en comentar Periodista Digital](#) · [Salud](#) · [Medicina](#)



Europa Press

[clipping](#)

La exposición a plaguicidas, clave en la calidad del semen

Europa Press, 16 de septiembre de 2010 a las 13:45

La exposición combinada a plaguicidas organoclorados es uno de los factores determinantes de la baja calidad del semen en jóvenes almerienses, según se desprende de un trabajo realizado en la Universidad de Granada (UGR), en el que se advierte de que presentar un número de espermatozoides en el semen inferior al nivel de referencia establecido por la OMS puede producir un retraso evidente en el tiempo requerido para lograr un embarazo con éxito.

Este trabajo, realizado en el Hospital Clínico de Granada por el investigador Clemente Aguilar, se ha basado en una muestra formada por 280 jóvenes voluntarios almeriense, de 18 a 23 años de edad, y reclutados en la Universidad de Almería.

En concreto, la hipótesis de esta investigación parte de la premisa de que una exposición a plaguicidas organoclorados incrementa el riesgo de alteraciones en los parámetros indicadores de la calidad seminal, un hecho que se relaciona con su capacidad de modificar la homeostasis de las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas masculino.

Además, alude al hecho de que el riesgo es mayor con la exposición combinada a varios plaguicidas, aún cuando la misma se produzca a bajas concentraciones.

Ahora los resultados de este trabajo de Clemente Aguilar, que ha estado dirigida por los investigadores de la UGR Marieta Fernández, Marina Lacasaña y Nicolás Olea, han demostrado también que la calidad seminal de los jóvenes del sureste peninsular se sitúa en una posición intermedia entre las descritas para otras poblaciones europeas, con cifras cercanas a las más altas reportadas.

Esta evaluación se ha llevado a cabo a través de la estimación del número total de espermatozoides (NTE) y el número total de espermatozoides móviles (NTEM).

La calidad seminal estimada en la población joven almeriense ha resultado depender también de múltiples factores, entre ellos, los modos de vida, considerando como tales el nivel de escolarización y trabajo; los parámetros físicos y bioquímicos, obesidad, niveles de hormonas sexuales y de lípidos en sangre; y la exposición ambiental.

ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL AMBITO DOMESTICO

En cuanto a la principal vía de exposición a plaguicidas en población general, este estudio apunta a los alimentos y otros productos utilizados a nivel doméstico. Además, detalla que, de los 18 plaguicidas analizados en la sangre de los individuos participantes, algunos están prohibidos en España, como el DDT. No obstante, otros como el fungicida vinclozolina (utilizado en cultivos y almacenamiento de vid y cítricos) son actualmente de uso legal en España.

Todas las muestras de suero analizadas contenían al menos un plaguicida en concentración cuantificable, siendo el promedio de plaguicidas detectados por muestra de 11 compuestos, con un rango comprendido entre 4 y 17. La mayor parte de jóvenes (62%) mostró tener entre 10 y 14 residuos de plaguicidas distintos analizados.

ESPERMATOZOIDES MALFORMADOS

Los resultados del estudio mostraron una fuerte asociación entre la exposición a vinclozolina y la frecuencia de espermatozoides malformados. Aunque no hay evidencia previa publicada sobre este potencial efecto de la vinclozolina para humanos, este trabajo aboga por la conveniencia de realizar estudios experimentales para confirmar este hallazgo.

De hecho, insiste que la exposición a mezclas complejas de plaguicidas organoclorados emerge como un determinante de la calidad seminal que no debería ser obviado en ningún estudio epidemiológico que trate de averiguar la influencia de factores ambientales.

LAVAR LOS PRODUCTOS CON AGUA Y JABON

Sin embargo, Clemente Aguilar puntualiza que la interpretación del efecto final resultante "no es sencilla, fundamentalmente porque estamos expuestos a mezclas de contaminantes ambientales y las interacciones entre los diferentes compuestos determinarán el efecto resultante, lo que hace aparentemente impredecible el efecto final".

El investigador de la UGR concluye que, para reducir o retirar la mayor cantidad de residuos de plaguicidas, "es muy importante lavarlos con agua y jabón, ya que este último corta la película grasa de la superficie de esos alimentos que contiene gran parte de residuos de plaguicidas".

COMPARTIR

Me gusta

Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

FÉNIX DIRECTO

Tu seguro desde





300€

200€

Todo riesgo

Terceros

www.fenixdirecto.com

Calcula aquí tu Seguro

Sé el primero en comentar

Deja aquí tus comentarios

Nombre, profesión, ciudad ...(obligatorio)

Comentario

No puedes escribir más de 1000 caracteres!

Teclea los caracteres de la imagen



[Ponme otra palabra](#)

☐ Acepto la [Política de privacidad](#)

Enviar Comentario

Noticias que le recomienda el Director

PERIODISTA DIGITAL

C. Valenciana - La Universidad

Manuel Hernández y el Asesino

PERIODISTA DIGITAL

Retirado un maquillaje de fantasía

animación hecha por ordenador



El Hospital Macarena (Sevilla)

incorpora un sistema de telefonía

Juega a El Gordo

Esta semana hay un Bote de

39Millones€

Jugar Ahora »

Servicio ofrecido por LOTOPIA

- [Vuelos](#)
- [Hoteles](#)
- [Coches](#)
- [Viajes](#)