- [Pisos](#) |
- [Coches](#) |
- [Empleo](#) |
- [Anuncios](#) |
- [11870](#)

- [Registrarse](#)
- [Iniciar sesión](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [4](#)

[Gabriel Albiac](#)

[R. Pérez-Maura](#)

[M. Martín Ferrand](#)

[Ignacio Camacho](#)

[Eduarne Uriarte](#)

«Chávez no enseña los dientes a esos tiburones yanquis y pigri...» Ausencia de bas... con gu... ante que... de las primarias, fruto de la torpeza de... «Queda el líder desnudo en su mediocridad y la imposible tarea de otra campaña electoral con su liderazgo»

[abc.es](#)

[Ir a abcdesevilla.es](#)

- [Actualidad](#)
 - [España](#)
 - [Internacional](#)
 - [Economía](#)
 - [Sociedad](#)
 - [Madrid](#)
 - [Local](#)
 - [Ciencia](#)
 - [Tecnología](#)
 - [Medios y Redes](#)

• [Opinión](#)

• [Deportes](#)

• [Cultura](#)

• [Estilo](#)

• [TV](#)

• [Multimedia](#)

• [blogs](#)

• [Comunidad](#)

• [Archivo](#)

• [servicios](#)

Buscador de abc

buscador

[Noticias agencias](#)

[Desarrollan un aparato para evaluar alteraciones de la visión nocturna](#)

06-10-2010 / 13:20 h

Granada, 6 oct (EFE).- Un grupo de científicos del departamento de Óptica de la [Universidad de Granada](#) ha desarrollado un programa que permite realizar un test visual para evaluar alteraciones de la visión nocturna, así como el instrumento necesario para aplicarlo, al que han dado el nombre de "halómetro".

Este test se ha comprobado con diversos grupos de observadores, como personas que han sido operadas de cataratas o de cirugía refractiva, observadores normales y pacientes con ciertas patologías oculares, como degeneración macular asociada a la edad y queratitis unilateral, ha informado la Universidad en un comunicado.

La prueba consiste en mostrar al sujeto un estímulo luminoso intenso sobre un fondo oscuro y, progresivamente, ir mostrándole estímulos luminosos periféricos, con menor luminancia, en torno al central, de forma aleatoria, y en diferentes posiciones y distancias al mismo.

El test se realiza en condiciones de baja iluminación, en una habitación oscura, pero antes de que comience el sujeto tiene un tiempo para adaptarse a la oscuridad y después, su tarea consiste en presionar el botón de un ratón cada vez que detecta un estímulo periférico.

Una vez finalizado el test, el programa calcula un parámetro, denominado índice de alteración visual, que junto con el gráfico de resultados determina la forma e intensidad de la alteración visual.

La Oficina de Software Libre de la [Universidad de Granada](#) se ha encargado de liberar este programa científico, de manera que de ahora en adelante es posible descargarlo gratuitamente desde internet.

Ha sido desarrollado por un equipo coordinado por Rosario González Anera, con apoyo de la empresa granadina Seven Solutions y la clínica oftalmológica madrileña Novovisión, y cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Los resultados obtenidos han sido presentados en congresos, nacionales, como la IX Reunión Nacional de Óptica, en Orense, e internacionales, como el Wavefront Congress 2009, y además, se ha publicado un artículo de investigación en la revista internacional "Applied Optics". EFE 1011063

Por comunidades