

- Portada
- Actualidad
- Noticias científicas
- Entrevistas
- Opinión
- Vídeos
- Archivo "Salut i Força"
- Archivo "Salut i Ciència"
- Sobre Salut i Força
- Contacto



En portada

Los recuerdos traumáticos se...

El cerebro humano utiliza dos...

El ictus es la segunda causa de...

Un sistema inmune fuerte podría...

Aumentan las enfermedades...

El 42% de las mujeres con cáncer...

Médicos del deporte alertan del...

La SEMI constituye un nuevo...

Los españoles consumimos sopa...

Uno de cada cuatro españoles...

Un nuevo procedimiento...

Un 21% de los médicos de familia...

Rafael Matesanz dice que España...

La fase piloto del proyecto de...

Elaboran una guía para mejorar...

Centralizar las estructuras de...

La genética y la progresión del...

Comentarios recientes

Jorge cuando me enteré que te habían concedido esta preciada medalla, no me extrañó... (Fructuoso Perojo)

Bueno siguiendo el post que puse el año pasado, os comento que para que no os pase... (RODIMAX)

por favor necesito ayuda soy paciente de angioedema y necesito ese medicamento, ya... (Lazara Rodriguez)

HOLA A TODAS,,,,,,, YA PASARON 5 MASES DE MIS 2 OPERACIONES HISTERECTOMIA TOTAL Y... (patricia silvana)

mi nombre es Lazara Rodriguez tengo 49 anos y estoy diagnosticada hace solo 6 anos,... (Lazara Rodriguez)

Hola, tengo 47 años, un hijito hermoso de 7 años y les quiero contar que hace 3... (Rosario)

HACE 3 MESES MI NOVIO ME DIJO QUE LE SALIO UNA VERRUGA EN SU PENE, FUE A CONSULTAR... (.....)

La mitad de los pacientes con trastorno bipolar sufre alguna discapacidad laboral, social o familiar



Salut i Força

- Añadir comentario
- Enviar a un amigo
- Enviar a Menéame

La mitad de los pacientes que sufren trastorno bipolar sufren algún tipo de discapacidad laboral, social y familiar, además de que el 20 por ciento aproximadamente presentan discapacidad en estos tres niveles, según se desprende un artículo científico publicado recientemente en la prestigiosa revista 'Psychiatry Research'.

Este trabajo, publicado por el doctor del Grupo de Investigación en Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad de Granada (UGR) Luis Gutiérrez Rojas, ha analizado los factores asociados a una mayor discapacidad laboral, social y familiar en una muestra de 108 pacientes diagnosticados de trastorno bipolar.

Esta investigación ha revelado que la discapacidad a nivel laboral en estos pacientes está relacionada con un mayor número de episodios maniacos, sufrir tres o más hospitalizaciones psiquiátricas, padecer sintomatología depresiva y tener un bajo nivel educacional. La alta adicción al tabaco también puede ser más discapacitante para los pacientes con trastorno bipolar laboralmente que los síntomas depresivos.

Gutiérrez Rojas afirma que la discapacidad a nivel social --dificultad para establecer relaciones fuera de la familia e integrarse socialmente-- en estos pacientes se asocia a sufrir un mayor número de hospitalizaciones y episodios depresivos, así como a tener síntomas activos de depresión. "Tener un gran apoyo social se asocia a una menor discapacidad social en estos pacientes", destaca el autor de este trabajo.

En último lugar, la discapacidad familiar, esto es, dificultad para tener buenas relaciones entre el paciente y otros miembros de su familia, se ha asociado a las hospitalizaciones, los episodios maniacos, la sintomatología depresiva y con una mayor puntuación en la escala CAGE que mide el abuso de alcohol.

"Si queremos evitar la discapacidad en los pacientes con trastorno bipolar, tenemos que evitar la recurrencia de la misma, evitando los episodios depresivos y maniacos, y actuando con prontitud para que los episodios se traten desde el primer momento y no desemboquen en una hospitalización", ha relatado.

Gutiérrez Rojas señala que la dependencia al tabaco, además de serias secuelas a nivel físico, está asociada a un peor pronóstico de la enfermedad bipolar. Al mismo tiempo, el apoyo social debe ser mejorado, "e incrementarse en aquellos pacientes que no lo tienen.

El abuso de alcohol es especialmente conflictivo a nivel familiar y es la sustancia adictiva más usada en esta enfermedad. "Explorar y detectar dicho consumo en estos pacientes es especialmente importante si queremos mejorar sus relaciones familiares".

Los resultados de este trabajo han sido presentados recientemente en el IV Encuentro Hispano-luso de Adherencia Terapéutica celebrado en Oporto (Portugal), donde fue galardonado con el tercer premio de investigación.

Enfermedad de bipolar
Habla con psiquiatras y resuelve dudas sobre la enfermedad en la red
www.puedoser.es

Anuncios Google

28 Octubre, 2010 11:47

Noticias científicas

Siguiente

Anterior

Comentarios (0)

Comentarios

Añadir comentario

Los comentarios son moderados para evitar spam. Esto puede hacer que tu escrito tarde un poco en ser visible.

Título

Texto

Tu nombre