

Un virus similar al que provoca el herpes puede ser un factor de inicio de la esclerosis múltiple, según un estudio

Directorio Esclerosis múltiple Hospital Universitario Nilo Occidental
Captación activa de los posibles casos

... Deja tu comentario

Imprimir Enviar

COMPARTE ESTA NOTICIA

tweet

11

me near

tuenti

NOTICIAS RELACIONADAS

La mutación en los genes BRCA aumenta un 50% el riesgo de cáncer de mama u ovario
(hoy a las 13:37)

Una nueva técnica reduce a minutos la secuenciación del ADN
(hoy a las 13:33)

Investigan el uso de la leche para reducir el riesgo de diabetes
(hoy a las 13:27)

Los pacientes con mutación de los genes BRCA tienen un 50% de riesgo de cáncer de mama u ovario a los 50 años (hoy a las 13:24)

EE.UU.- Una sustancia natural presente en los lácteos podría reducir el riesgo de diabetes, según estudio
(hoy a las 13:51)

Selección realizada automáticamente por Colbenson

SUSCRÍBETE A LAS NOTICIAS DE ANDALUCÍA EN TU ENTORNO:

Titulares en tu Web
Boletín Personalizado

GRANADA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El virus de Epstein-Barr (VEB), perteneciente a la familia de los herpesvirus, que también incluye el virus del herpes simple y el citomegalovirus, podría ser uno de los factores ambientales que desencadenaría la esclerosis múltiple.

Así lo han puesto de manifiesto especialistas de la Universidad de Granada (UGR), que han analizado la presencia de este virus en enfermos con esclerosis múltiple, mediante el estudio del índice de anticuerpos, es decir, los anticuerpos que son producidos en el interior del Sistema Nervioso Central y que, por lo tanto, podrían estar directamente implicados en el desarrollo de la esclerosis.

La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que afecta al Sistema Nervioso Central y de la que no se conoce la causa que la provoca, aunque parece existir cierta susceptibilidad genética en los individuos que la padecen, asociada a ciertos factores ambientales que podrían desencadenar la enfermedad, según ha resaltado este lunes en una nota la propia UGR.

Pese a que varios estudios han intentado determinar cómo la infección por el virus de Epstein-Barr se podría considerar un factor de riesgo para desarrollar la Esclerosis Múltiple, los científicos granadinos han realizado ahora un meta-análisis de estudios observacionales de casos y controles, cuyo fin es determinar esta asociación.

ESTUDIO CON 151 PERSONAS

Además, en un grupo de pacientes con esclerosis múltiple formado por 76 personas, y en otro de 75 personas sin la enfermedad se buscó un patrón que intentara asociar el virus y la esclerosis múltiple.

Para ello, se determinó la presencia de anticuerpos frente a los antígenos del virus, sintetizados en el sistema nervioso central, así como la detección de ADN vírico para investigar el índice de anticuerpos frente al VEB en el sistema nervioso central y la presencia de ADN de VEB, respectivamente.

Esta investigación ha sido realizada por Olivia del Carmen Santiago, del departamento de Microbiología de la UGR, y dirigida por los profesores José Gutiérrez Fernández, Antonio Sorlózano y Óscar Fernández Fernández.

En concreto, los científicos han obtenido una asociación estadísticamente significativa entre la infección vírica y la esclerosis múltiple, a partir de la detección de marcadores que, fundamentalmente, indican infección pasada y no con los que indican infección reciente o reactivación.

Del Carmen Santiago ha afirmado al hilo de ello que, debido a que todavía se desconocen los factores que desencadenan esta enfermedad, "es importante empezar a estudiarlos y, si es posible, desarrollar algún tipo de profilaxis frente a éstos".

En este estudio, se ha encontrado asociación con ciertos marcadores de infección del virus, "pero para poder obtener una conclusión definitiva es necesario que se desarrollen nuevas investigaciones, con un número suficiente de pacientes, que utilicen la combinación de varias técnicas microbiológicas, donde se determinen los diferentes marcadores de infección vírica valorando la situación clínica del paciente e incluso años antes de la aparición de los primeros síntomas de la esclerosis múltiple", ha concluido.

Lectores de esta noticia también han leído:

Diputación compromete ayuda técnica y económica para las playas dañadas en Torrenueva

Andalucía ofrecido por

Cajasol

A LA ÚLTIMA EN CHANCE



SARA CARBONERO Y ANTONIO BANDERAS, UNA ENTREVISTA DE CAMPEONATO

DEPORTES



CASILLAS: "TENEMOS DESCARO Y GANAS DE DISFRUTAR"

LOTERÍA DE NAVIDAD

Encuentra donde venden tu número:

Buscar

Más Noticias Más Leídas

Cancelados seis vuelos que unen Málaga y Sevilla con los aeropuertos del Reino Unido

La Junta suprime las ayudas a las agencias de fomento del alquiler

Los productores de Trevélez obsequiarán con un jamón al profesor denunciado por una familia musulmana

El 70% de los andaluces cree que los medios tratan la política de forma sensacionalista

Más de 5.800 pacientes del Virgen del Rocío reciben ya su terapia respiratoria en sus domicilios

El nuevo director general de Regadíos de la Junta, "muy ilusionado" ante "un reto tan importante"

La familia del joven atropellado en el Polígono Store organiza una marcha este miércoles para pedir Justicia