

Noticias ▼

Nacionales

Economía

Internacionales

Deportes

Entretenimiento

Agenda Cultural

Salud

Ciencia y Tecnología

Reporte Gerencial

Turismo

Moda

Documentos

Esto fue noticia

Toque de Diana

Saber vivir

Plomovisión

Otra Visión

Globovisión en la mira

Curiosidades

En Privado

Todo sobre mi padre

Primarias 2012

Secciones ▼

Prog. Opinión

Reportero Digital

Ud. Lo Vio

Así Cocina Soucy

Programación

Gaceta Oficial

Análisis y Opinión

EL DATO
Información Exclusiva

GLOBOVISIONradio

CASO
DE INVESTIGACIÓN

Inicio » Salud

Confirman relación entre la calvicie prematura y los problemas de próstata


 JMS - Globovisión/EFE
 07/03/2012 07:20:53 a.m.

1

Me gusta

15

Enviar

Científicos españoles han confirmado la relación entre la alopecia androgenética, es decir, la calvicie prematura, y la hiperplasia benigna prostática (HBP), un crecimiento no maligno de la próstata que aparece en los hombres con la edad relacionado con algunas hormonas.



Según informó hoy la Universidad de Granada (sur de España), esta enfermedad se da en más del 50 por ciento de los hombres de 60 años y provoca síndrome miccional o necesidad de orinar muchas veces.

El estudio científico, publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología y ganador del primer premio del 68 Congreso Anual de la citada institución americana, explica que los hombres que sufren alopecia precoz tienen más posibilidades de padecer HBP que el resto.

La alopecia androgenética es la más frecuente de las calvicies, se da mucho más en los hombres que en las mujeres y tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento.

La hiperplasia benigna también es la enfermedad de la próstata más frecuente, provoca un crecimiento anormal y desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la formación de un tumor benigno que obstruye la salida de la orina.

En este estudio participaron 87 hombres, de los que 45 habían sido diagnosticados por el dermatólogo de alopecia androgénica, mientras que los otros 42 estaban sanos y fueron considerados como control.

Los resultados demostraron que existía una relación clara y directa entre los sujetos con calvicie temprana y los que padecían hiperplasia benigna prostática.

El trabajo fue realizado por los investigadores de la Universidad de Granada, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y del Hospital St. Thomas de Londres.

Publicidad



netsaluti
www.netsaluti.com

canal dietas

¿quieres saber cómo adelgazar comiendo manzana?

Rif. J-30871557-3