Vier
Actu
No estás registrado | Acceder | Crear cuent
Publicidad

CIENCIA

OTRAS NOTICIAS

Dos tercios de esquizofrénicos en países pobres no cuentan con tratamiento

Explican los ritmos cardiacos que conducen a la muerte súbita

El virus del herpes simple activa la respuesta inmune en vez de bloquearla

Hallan cómo incrementar células regenerativas para tratar dolencias hepáticas

Un estudio japonés revela que la vitamina E podría perjudicar a la masa ósea

Confirman relación entre la calvicie prematura y los problemas de próstata

El test de sangre en heces resulta tan eficaz como la colonoscopia para detec...

Las enfermedades raras afectan a cinco de cada 10.000 personas

La OMS revisará las recomendaciones para prevenir la hemorragia después del p...

Investigadores españoles descubren que un gen anticáncer combate también la o...

Cuba ha aplicado tratamientos con células madre a unos 3.700 pacientes

Seleccione el tamaño de la fuente Elegir tamaño

7 de Marzo del 2012, 9:38 AM

Confirman relación entre la calvicie prematura y los problemas de próstata

enviar imprimir favoritos

GRANADA (España), 7 mar (EFE).- Científicos españoles han confirmado la relación entre la alopecia androgenética, es decir, la calvicie prematura, y la hiperplasia benigna prostática (HBP), un crecimiento no maligno de la próstata que aparece en los hombres con la edad relacionado con algunas hormonas.

Según informó hoy la Universidad de Granada (sur de España), esta enfermedad se da en más del 50 por ciento de los hombres de 60 años y provoca síndrome miccional o necesidad de orinar muchas veces.

El estudio científico, publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología y ganador del primer premio del 68 Congreso Anual de la citada institución americana, explica que los hombres que sufren alopecia precoz tienen más posibilidades de padecer HBP que el resto.

La alopecia androgenética es la más frecuente de las calvicies, se da mucho más en los hombres que en las mujeres y tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento.

La hiperplasia benigna también es la enfermedad de la próstata más frecuente, provoca un crecimiento anormal y desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la formación de un tumor benigno que obstruye la salida de la orina.

En este estudio participaron 87 hombres, de los que 45 habían sido diagnosticados por el dermatólogo de alopecia androgénica, mientras que los otros 42 estaban sanos y fueron considerados como control.

Los resultados demostraron que existía una relación clara y directa entre los sujetos con calvicie temprana y los que padecían hiperplasia benigna prostática.

El trabajo fue realizado por los investigadores de la Universidad de Granada, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y del Hospital St. Thomas de Londres. EFE

Recomienda este artículo en:

Opina sobre esta noticia. click aquí.
Todavía no hay ningún comentario para esta noticia. Si desea, puede escribir uno ahora.

Copyric