

Principal

Confirman la relación entre la calvicie prematura y los problemas de próstata

Autor: abc.es el Mié, 07/03/2012 - 11:56.

[calvicie](#) [Próstata](#) [Salud y bienestar](#)[Recomendar](#)

0

3

Científicos españoles han confirmado la relación entre la alopecia androgenética, que es la calvicie común que aparece de forma prematura, y la hiperplasia benigna prostática (HBP), un crecimiento no maligno en el tamaño de la próstata que aparece en los hombres con la edad relacionado con algunas hormonas.

Según ha informado hoy la Universidad de Granada, esta enfermedad se da en más del 50 % de los hombres de 60 años y provoca la síndrome miccional o necesidad de orinar muchas



veces.

Según se desprende de un artículo publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología, y que ganó el primer premio del 68 Congreso Anual de la citada institución americana, los hombres que sufren alopecia precoz tienen más posibilidades de padecer

Síguenos en...

16000

65

[Me gusta](#)

@informe21

Ultimas noticias

[La luz combate la ansiedad](#)[Euro sube a 1,32](#)[Operativos de c
estarán hoy en c
parroquias de C](#)[Alemania vive el
consecutivo de
sector público](#)

HBP que el resto.

La alopecia androgenética es la más frecuente de las calvicies, se da mucho más en los hombres que en las mujeres y tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento.

La hiperplasia benigna también es la enfermedad de la próstata más frecuente, provoca un crecimiento anormal y desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la formación de un tumor benigno que obstruye la salida de la orina.

En este estudio participaron 87 hombres, de los que 45 habían sido diagnosticados por el dermatólogo de alopecia androgénica, mientras que los otros 42 estaban sanos y fueron considerados como control.

A todos ellos se les midió el volumen prostático a través de una ecografía transrectal y el flujo urinario por flujometría urinaria. También se les realizó un estudio hormonal y el Índice Internacional de Puntuación de la función eréctil.

Los resultados demostraron que existía una relación clara y directa entre los sujetos con calvicie temprana y los que padecían hiperplasia benigna prostática. Este trabajo ha sido realizado por los investigadores de la Universidad de Granada, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y del Hospital St. Thomas de Londres.

Fuente: [ABC.es](#)

EA

Compartir

0

3

Recomendar

Enviar por correo esta página Versión para impresión

Noticias relacionadas

- 

Los hombres ya no quieren ser calvos
- 

Toxina botulínica en la cabeza, una nueva manera de terminar con la calvicie
- 


Para mantener la próstata sana hay que cambiar de hábitos después de los cuarenta
- 

La calvicie puede llegar a ser beneficiosa para la salud, según estudio

Comentarios


Noticias más leídas

- 


Jueza del reality se le prendió su sexual en un aer
- 


Novia queda de camino al altar y "sus secretos" m

(fotos)
- 

!Hilda Abrahamz Revista Playboy
- 

El mejor trasero muestra sus curv Barbados (fotos)
- 

Horrible: Embaraz veces a mujer co para vender a su
- 

Mujer adicta a d crecer las uñas c pies
- 

Demanda a su U porque su comp cuarto tiene den

sexo
- 

Rumores de histo amor entre Dios Kelvim Escobar
- 

La actriz mexicana Jacqueline Arroy desnuda para Pl

(fotos infartantes)