



EL PAIS

LA PROVINCIA

EL MUNDO

ECONOMIA

INFORMACION GENERAL

DEPORTES

POLICIALES

ESPECTACULOS

Recomendá esta nota

Relacionan calvicie prematura con los problemas de próstata

IMAGENES



Científicos españoles han confirmado la relación entre la alopecia androgenética, es decir, la calvicie prematura, y la hiperplasia benigna prostática (HBP), un crecimiento no maligno de la próstata que aparece en los hombres con la edad relacionado con algunas hormonas.

Según informó hoy Universidad de Granada (España), la HBP se da en más del 50 por ciento de los hombres y provoca síndrome miccional o necesidad de orinar muchas veces.

El estudio científico, publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología y ganador del 68 Congreso Anual esa institución, explica que los hombres que sufren alopecia precoz tienen posibilidades de padecer HBP que el resto.

La alopecia androgenética es la más frecuente de las calvicies, se da mucho más en los hombres que en las mujeres y tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento.

La hiperplasia benigna también es la enfermedad de la próstata más frecuente, provoca un crecimiento desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la formación de un tumor que obstruye la salida de la orina.

Estudio

En el estudio participaron 87 hombres, de los que 45 habían sido diagnosticados por el dermatólogo por alopecia androgenética, mientras que los otros 42 estaban sanos y fueron considerados como control.

Los resultados demostraron que existía una relación clara y directa entre los sujetos con calvicie que padecían hiperplasia benigna prostática.

El trabajo fue realizado por los investigadores de la Universidad de Granada, del Hospital Universitario de Granada y del Hospital St. Thomas de Londres.

Frecuencia

En tanto, el urólogo Andrés Vázquez, Especialista en Andrología y miembro del Departamento de Urología del Instituto Médico de Buenos Aires, indicó que la hiperplasia prostática benigna "es una de las enfermedades más frecuentes entre los varones adultos" y que "comienza a manifestarse alrededor de la cuarta década aumentando su incidencia con el pasar del tiempo; a partir de los 60 años, aproximadamente un 5 por ciento de los hombres sufren un deterioro en el flujo urinario como consecuencia del aumento del tamaño prostático, tratamiento".

Al hablar algunos de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, el profesional mencionó el inicio de la micción, flujo de orina débil, muchas veces entrecortado; vaciado incompleto de la vejiga y frecuencia de micción durante el día y necesidad de levantarse por la noche para orinar.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

TELEFONOS
UTILESHORARIOS
DE TRENESPUBLIQUE
SU CLASIFICADO

Me gusta

Sé el primero de tus amigos al que le