terra NOTICIAS

Terra Noticias / EFE

Miércoles 7 de Marzo de 2012 12:09

Más del 50% de la población masculina padece hiperplasia benigna prostática

Confirman relación entre la calvicie prematura y los problemas de próstata

En el estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad y el Hospital San Cecilio de Granada y el Hospital St. Thomas de Londres se ha constatado la relación entre ambas patologías.

Compartir
0
menéalo

Me gusta 7

La alopecia androgénica tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento

La hiperplasia benigna provoca un crecimiento anormal y desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la formación de un tumor benigno que obstruye la salida de la orina

Los resultados demostraron que existía una relación clara y directa entre los sujetos con calvicie temprana y los que padecían hiperplasia benigna prostática

Científicos españoles han confirmado la relación entre la **alopecia androgénica**, que es la calvicie común que aparece de forma prematura, y la **hiperplasia benigna prostática** (HBP), un crecimiento no maligno en el tamaño de la próstata que aparece en los hombres con la edad relacionado con algunas hormonas.

Según informa la Universidad de Granada, esta enfermedad se da en **más del 50 % de la población masculina de 60 años** y provoca **síndrome miccional** o necesidad de orinar muchas veces.

Uno de los artículos publicados en la revista de la Academia Americana de Dermatología, los hombres que sufren **alopecia precoz** tienen más posibilidades de padecer HBP que el resto.

La alopecia androgénica es la más frecuente de las calvicies, se da mucho más en los hombres que en las mujeres y tiene un **componente hereditario** y **evoluciona progresivamente sin tratamiento**.

La hiperplasia benigna también es la enfermedad **de la próstata más frecuente**, provoca un crecimiento anormal y desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la **formación de un tumor benigno** que obstruye la salida de la orina.

En este estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Granada, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y del Hospital St. Thomas de Londres, **han participado 87 hombres**, de los que 45 habían sido diagnosticados por el dermatólogo de alopecia androgénica, mientras que los otros 42 estaban sanos y fueron considerados como control.

A todos ellos se les midió el volumen prostático a través de una ecografía transrectal y el flujo urinario por flujometría urinaria. También se les realizó un estudio hormonal y el Índice Internacional de Puntuación de la función eréctil.

Los resultados demostraron que existía una **relación clara y directa** entre los sujetos con calvicie temprana y los que padecían hiperplasia benigna prostática.

Compartir
0
menéalo

Me gusta 7