

NO INHIBEN LA PROLIFERACIÓN CELULAR

Un estudio demuestra que el ibuprofeno favorece la reparación del hueso tras una fractura

Un estudio realizado en la Universidad de Granada ha demostrado que el ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo, tiene propiedades beneficiosas en la reparación del hueso después de una fractura o una cirugía ósea.

Me gusta

14

0

Compartir

0 Comentarios



Una pastilla de Ibuprofeno | Foto: EFE

EP | Granada | Actualizado el 22/06/2012 a las 13:15 horas

Los científicos han comprobado en ensayos 'in vitro' que este fármaco, administrado a dosis terapéuticas, no muestra un efecto adverso sobre la capacidad proliferativa ni sobre la síntesis de osteocalcina del osteoblasto, célula directamente implicada en el proceso de formación y regeneración del tejido óseo, a diferencia de otros antiinflamatorios no esteroideos.

Los osteoblastos son las células del hueso, sintetizadoras de la matriz ósea, por lo que desempeñan un papel fundamental tanto en el desarrollo como en el crecimiento del hueso, encargándose de su mantenimiento, crecimiento y reparación.

En un artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista 'Journal of bone and mineral metabolism', los científicos de la Universidad de Granada han valorado muy positivamente los efectos del ibuprofeno en las terapias relacionadas con el tejido óseo. Todos ellos pertenecen al Grupo de investigación BIO277, que estudia el efecto de distintos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos sobre el osteoblasto.

Como explica la profesora del departamento de Enfermería de la Universidad de Granada Concepción Ruiz Rodríguez, autora principal del estudio, hasta la fecha "apenas se tenía información" sobre el efecto del ibuprofeno sobre los osteoblastos.

El trabajo realizado en la UGR ha demostrado que las dosis terapéuticas de ibuprofeno no inhiben la proliferación celular y la síntesis de la osteocalcina en la línea celular MG-63, mientras que, si se administra a una dosis más alta puede producir alguna activación de las células, lo que podría explicar el aumento en la expresión de marcadores de membrana y la disminución de la capacidad fagocítica.

Me gusta

14

0

Compartir

0 Comentarios

Síguenos en >>



El equipo del cirujano Pedro Cavadas reimplanta los pies a un niño



Extirpan un tumor de 168 gramos a un feto de 31 semanas fuera del útero materno



Publican un estudio sobre las mutaciones del virus de la gripe aviar vetado por EE.UU



Si dices que fumar es malo... ¿por qué fumas tú?



Distribuían sustancias prohibidas con fórmulas magistrales para adelgazar