



PORTADA HOROSCOPO ENCUESTAS NOSOTROS PATROCINADOR CATEGORIAS

Nosotros Encuestas Horoscopo Patrocinador Permanezca conectado

Buscador

El uso de drogas empeora el funcionamiento sexual de los varones

18 diciembre 2012 | Categoría: Salud | Escrito por: Pueblo y Sociedad Noticias

- [Publicarlo en Facebook](#)
- [Publicarlo en Twitter](#)
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- [Añadirlo a LinkedIn](#)
- [Añadirlo a Google Bookmarks](#)
- [Publicarlo en Delicious](#)
- [Publicarlo en StumbleUpon](#)
- [Añadirlo a Reddit](#)
- [Enviar vía Gmail](#)
- [Enviar vía E-mail program](#)
- [Imprimir con PrintFriendly](#)



Imagen Ministerio Secretaría General de Gobierno

Así lo evidencia un estudio de la Universidad de Granada y la Universidad Santo Tomás de Colombia

MADRID, 18 Noticias de Salud

El uso de drogas empeora el funcionamiento sexual de los varones, así mismo en seguida de años de abstinencia, según evidencia un estudio ejecutado por la Universidad de Granada y la Universidad Santo Tomás de Colombia, y divulgado en la revista 'Journal of Sexual Medicine'.

De esta forma, esta investigación contradice otros estudios previos que aseguraban que, a las tres semanas de dejar el uso, "el funcionamiento sexual volvería espontáneamente a su nivel normal". Así lo aseguran los adalides de este proyecto, el profesor de este medio universitario colombiano, Pablo Vallejo Medina; y su homólogo en la universidad nazarí, Juan Carlos Sierra Freire.

Tras evaluar el funcionamiento sexual de un total de 905 varones, de los que 550 estaban diagnosticados de dependencia de siete trascendencias de uso preferente, los investigadores han obtenido esta conclusión. Las drogas y combinaciones de las mismas de las que eran usuarios de costumbres eran "alcohol, cocaína, cocaína y alcohol, heroína, marihuana y heroína y cocaína", explican.

[Inicio](#) | [Nosotros](#) | [Encuestas](#) | [Horoscopo](#) | [Patrocinador](#) | [RSS](#)

De todas estas, la que más afecta a la excitación o potencial eréctil es el alcohol. A este apunte se arribó tras analizar el deseo sexual, la satisfacción sexual, la excitación sexual y el orgasmo, aspectos que “se hallaban simbolizativa y moderadamente más perjudicadas en el grupo usuario de drogas que en el de eselos sujetos que no consumían”, subrayan.

En concreto, el placer sexual se ve más perjudicado por el uso conjunto de heroína y cocaína, en tanto que los usuarios de cocaína “tienen un deseo sexual enormemente elevado en fases agudas de uso”, reseñan. Respecto al orgasmo, las personas que consumen heroína “son las más perjudicadas”, concluyen.

Fuente: Terra

El uso de drogas empeora el funcionamiento sexual de los varones

18 diciembre 2012 | Categoría: Salud | Escrito por: Pueblo y Sociedad Noticias

- [Publicarlo en Facebook](#)
- [Publicarlo en Twitter](#)
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- [Añadirlo a LinkedIn](#)
- [Añadirlo a Google Bookmarks](#)
- [Publicarlo en Delicious](#)
- [Publicarlo en StumbleUpon](#)
- [Añadirlo a Reddit](#)
- [Enviar vía Gmail](#)
- [Enviar vía E-mail program](#)
- [Imprimir con PrintFriendly](#)